XYLELLA FASTIDIOSA

**IL PATOGENO E L'ATTUALE SITUAZIONE
FITOSANITARIA**

Servizio Fitosanitario Regionale

San Benedetto del Tronto, 09/03/2023

Xylella fastidiosa Well et al. (1987)

BATTERIO fitopatogeno Gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle *Xanthomonadaceae*

ESTREMAMENTE POLIFAGO

rapporto EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) del 2020 descrive 595 Specie vegetali, 275 Generi, 85 Famiglie botaniche differenti

Inserito nella lista del Reg.1702/2019 **Organismi Nocivi Prioritari per l'Unione**

Il nome assegnato a questo organismo nocivo svela già 2 aspetti fondamentali della sua biologia:

- ***Xylella*** deriva da XYLEMA nicchia ecologica del patogeno all'interno della pianta ospite
- ***Fastidiosa*** dovuto alla difficoltà di isolare e studiare questo patogeno in laboratorio

1880 In California: Malattia di Pierce della vite

J. Clark, Università della California, Berkeley (USA).

Fine anni '90 In Brasile: Clorosi variegata degli agrumi - CVC

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Alexander Purcell, University of California, Bugwood.org

UGA1262026

2013 Puglia: Disseccamento rapido dell'Olivo

Distribuzione geografica

Situazione UE (Italia esclusa)

- **2015 Francia:** Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra
- **2016 Spagna:** Isole Baleari
- **2017 Spagna:** Alicante
- **2018 Spagna:** Madrid
- **2018 Portogallo:** Porto
- **2020 Francia:** Occitania
- **2021 Portogallo:** Lisbona, Algarve

Intercettazioni: Germania, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Svizzera, Belgio

Situazione in Italia

- **2013 Puglia:** Gallipoli (LE)
- **2018 Toscana:** Monte Argentario (GR)
- **2019 Lazio:** Canino (VT)

Le altre regioni INDENNI
(DM 6 giugno 2019)

- **2022 Lazio:** Tarquinia (VT)

Modalità di diffusione

Movimentazione di
materiale di
propagazione infetto:
piante, porzioni di
piante, talee
(semi esclusi)

Insetti vettori
provenienti da aree dove
è presente l'organismo
nocivo

Movimentazione di piante e prodotti vegetali

Fattori di rischio

MOLTO PROBABILI

- Introduzione di XF sul territorio tramite specie ospiti asintomatiche
- Trasferimento ad un ospite sensibile mediante uso di materiale di propagazione (portainnesti, marze, gemme)
- Capacità di sopravvivenza del batterio durante il trasporto molto elevata
- Trasporto passivo degli insetti vettori insieme al materiale vegetale o su container

POCO PROBABILI

- Prodotti vegetali: frutta e fiori recisi
- Legname se privo di tutte le parti verdi della pianta
- Introduzione di piante per programmi di breeding o a scopo di ricerca

Vettori potenziali *Xylella fastidiosa*

Ordine: *Hemiptera*

Sottordine: *Auchenorrhyncha*

Infraordine: *Cicadomorpha*

Famiglie: *Aphrophoridae e Cicadellidae*

*Aphrophora
alni*

*Aphrophora
salicina*

*Philaenus
spumarius*

*Neophilaenus
lineolatus*

*Cercopis
sanguinolenta*

*Cercopis
vulnerata*

*Cicadella
viridis*

*Graphocephala
fennahi*

Vettori rilevanti in Italia

(A) *Philaenus spumarius*; (B) *Philaenus italosignus*; (C) *Neophilaenus campestris* .

Distribuzione geografica di *Philaenus spumarius*

● Present

● Transient

2023-02-28

(c) EPPO <https://gd.eppo.int>

Philaenus spumarius L.

www.nuzban.scholaris.pl

Autore: Ugo Picciotti

Autore: David Gould

Ciclo *Philaenus spumarius*

Grafica Infoxylella®,
 revisione D. Bosco,
 V. Cavalieri e
 E. Dongiovanni
 Fotografie di
 A. Coti e V. Cavalieri

Ciclo Xylefa

Piante ospiti

Ampia gamma di ospiti vegetali

sia in forma latente (piante serbatoio asintomatiche) che associata a sintomi più o meno gravi

EFSA 2020 (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) **riporta 595 Specie vegetali** ospiti:

- 343 confermate con l'ausilio di almeno 2 diversi test molecolari per il rilevamento di X. Fastidiosa
- 192 specie individuate infette in condizioni naturali o sperimentali

Il Database dell'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en

include tutte le specie di piante ospiti in cui l'agente patogeno è stato rilevato e segnalato ed è soggetto a costante aggiornamento

Ai sensi del Reg UE 2020/1201 - art. 25 le seguenti **specie** sono **a maggior rischio di infezione**:

Coffea spp., *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.)

Piante ospiti

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201:
Misure per prevenire l'introduzione e la diffusione
nell'Unione di *Xylella fastidiosa*

Piante ospiti (All.1):

Tutte le specie vegetali risultate infette dall'organismo nocivo
specificato* nel mondo

Piante specificate (All.2):

Piante ospiti risultate infette da una particolare
sottospecie dell'organismo nocivo specificato*

* Organismo nocivo specificato: *Xylella fastidiosa* e tutte le sue sottospecie

Sottospecie di *Xylella fastidiosa*

Fonte:

Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy

- subsp. *fastidiosa*
- subsp. *sandyi*
- subsp. *morus*
- subsp. *multiplex*
- subsp. *pauca*

Piante ospiti

Olivo

Foto 1-4: SFR Marche - Nardi

Foto 3-5: Donato Boscia, CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS, Bari (IT)

Foto 2: Camille Picard (DGAL-SDQP, FR)

Oleandro

Françoise Petter (EPP0)

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Donato Boscia, CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS, Bari (IT)

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Oleandro

Sintomi su caffè

Mandorlo

Ciliegio

Polygala

Jerôme Jullien, NPPO della Francia
Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Celine Vidal FR

Rosmarino e Lavanda dentata

Alloro, Westringia e Crisantemo

Celine Vidal FR
Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Celine Vidal FR

Donato Boscia, ENR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS, Bari (IT)

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Ginestra

Foto: Celine Vidal FR

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Xylella fastidiosa (XYLEFA) - <https://gd.eppo.int>

Mirto

Foto: Phillip M Brannen, Università della Georgia (USA)

Acacia saligna

AGOSTO 2014

IPSP-CNR

MARZO 2016

IPSP-CNR

Controllo della malattia

- Ricerca dei tratti genetici di resistenza nel germoplasma olivicolo
- Esplorazione di approcci molecolari per contenere la moltiplicazione e il movimento batterico nelle piante ospiti [N-acil cisteina (NAC), lipopeptidi lineari]
- Agenti di bio-controllo (batteriofagi, endofiti, microrganismi antagonisti)

(Contributo progetti POnTE e XF-FACTORS finanziati dal programma UE Horizon 2020)

SFR Marche - Pizzichini

Ogliarola salentina

Leccino

Fonte: Informatore Agrario

Sorveglianza del territorio

Al fine di contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* la Commissione europea ha emanato specifiche misure fitosanitarie che prevedono un monitoraggio periodico del territorio e delle attività commerciali, nonché l'adozione di misure di eradicazione e contenimento nelle aree colpite.

Riferimenti normativi:

- **DM 24 gennaio 2022:** Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)
- **DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19** «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
- **Regolamento (UE) 2020/1201:** misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)
- **Nota tecnica Mipaaf n. 9240028 del 14/10/2020:** Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*
- **DM 6 giugno 2019** «Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana»
- **EFSA (European Food Safety Authority):** Pest survey card on *Xylella fastidiosa* (2019)
- **EFSA (European Food Safety Authority):** Guidelines for statistically sound and risk-based survey of *Xylella fastidiosa* (2020)
- **Standard EPPO PM 3/82 (1):** Inspection of places of production for *Xylella fastidiosa*. EPPO Bulletin 49 (3)
- **Standard EPPO PM 7/24 (4):** Diagnostic standard for *Xylella fastidiosa*. EPPO Bulletin 49 (2)

Reg UE 2020/1201 - art. 2

Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri

1. Gli Stati membri svolgono **indagini annuali sulle piante ospiti** per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato nei rispettivi territori.
2. Tali indagini sono effettuate dalle autorità competenti o sotto la supervisione ufficiale di queste ultime.
3. Le suddette indagini sono eseguite **in base al livello di rischio**. Esse si svolgono all'aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.
4. Tali indagini consistono nel **prelievo di campioni** e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di **rilevare**, all'interno dello Stato membro interessato, **un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %**.
5. Le suddette indagini sono effettuate **in periodi adatti dell'anno** per quanto riguarda la possibilità di **rilevare l'organismo nocivo specificato**, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.

Modelli di diffusione potenziale

Distribuzione potenziale di *Xylella fastidiosa* in relazione all'influenza di **Variabili bioclimatiche**

ALTA PROBABILITA' di colonizzare aree caratterizzate da:

- Bassa altitudine (0-150 m s.l.m.)
- Precipitazioni nei mesi più siccitosi <10mm e tra 80-110mm nei mesi più piovosi e durante il trimestre più caldo <60mm
- Temperature del trimestre più freddo $\geq 8^{\circ}\text{C}$
- Aree rurali ad agricoltura intensiva, sistemi colturali complessi, oliveti, colture annuali associate a colture permanenti, frutteti e vigneti, foreste (boschi e querce), macchia mediterranea

Idoneità climatica stimata per *Xylella fastidiosa*

EFSA Journal 2019; 17(5): 5665

Idoneità climatica stimata per *Xyllella fastidiosa*

Servizio Fitosanitario Marche – Servizio Agrometeo Regionale

Modello elaborato da *Maxent ver. 3.3.3k*

Parametri utilizzati:

- Altitudine 0-150 m s.l.m
- precipitazioni < 10 mm nei mesi più piovosi e nel trimestre più caldo < 60 mm)
- temperature del trimestre più freddo $\geq 8^{\circ}\text{C}$
- aree rurali ad agricoltura intensiva

Le variabili sono risultate simultaneamente favorevoli a XF:

- Senigallia, 2001
- Morro d'Alba, 2015

Siti a rischio da monitorare

Attività a rischio	Siti a rischio
Produzione, stoccaggio e movimentazione di piante ospiti	Vivai e centri di giardinaggio che producono, moltiplicano e allevano piante ornamentali, piante agrarie o alberi per verde urbano, ecc..
Trasporto di materiale di propagazione	<ul style="list-style-type: none">• Blocchi lungo le arterie stradali e le ferrovie (es. parcheggi per camion) per i percorsi collegati alle aree infette (rilascio involontario del vettore)• Aeroporti e porti con movimento di materiale vegetale da paesi in cui è presente il patogeno
Turismo	<ul style="list-style-type: none">• Spostamento o acquisto di piante ospiti vegetali da parte dei cittadini (collezionisti)• giardini in vicinanza di siti turistici• Spostamento di veicoli e imbarcazioni dalle aree in cui è presente il batterio verso aree indenni idonee alla sua stabilizzazione

Misure di monitoraggio

Periodo:

- Campi aperti (territorio): durante la stagione vegetativa
- Siti di produzione (vivai): tutto l'anno

Sulla vegetazione

- **Ispezioni visive** (*visual inspection*)
- **Campionamento** (*sample taking*): materiale vegetale sintomatico ed asintomatico

Sui vettori

- **Campionamento forme adulte:**
 - Retini da sfalcio (*sweeping net*)
 - Trappole cromotropiche (*sticky traps*)

Reg UE 2020/1201 - art. 25

Spostamenti all'interno dell'Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all'interno di un'area delimitata

1. Le **piante specificate** che non sono mai state coltivate all'interno di un'area delimitata **possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se** sono state coltivate in un **sito** che **soddisfa le condizioni seguenti**:

a) appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezione annuale da parte dell'autorità competente;

b) è sottoposto, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV e tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.

2. In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb possono essere spostate per la prima volta all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall'autorità competente;

b) il sito è sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa* e con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.

Nota tecnica del MIPAAF prot. 9240028 del 14/10/2020:

Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi del Reg UE 2020/1201 - art. 25

Controllo rafforzato di **AREE INDENNI** nei **SITI DI PRODUZIONE** anteriormente il primo spostamento all'interno dell'Unione di:

- *Coffea spp.*
- *Lavandula dentata*
- *Nerium oleander*
- *Olea europea*
- *Polygala myrtiflora*
- *Prunus dulcis*

- ✓ **Maggiormente sensibili
alle diverse sub-specie europee
di *Xylella fastidiosa***
- ✓ **Ampia diffusione in ambienti
naturali, urbani e coltivati**

Nota tecnica del MIPAAF prot. 9240028 del 14/10/2020:

Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi del Reg UE 2020/1201 - art. 25

Gli Operatori Professionali comunicano per tempo al Servizio Fitosanitario competente per territorio il momento del primo spostamento delle produzioni e potranno emettere il relativo Passaporto delle piante esclusivamente dopo aver ricevuto il risultato delle analisi previste.

Previsione di produzione annuale

DITTA:		CENTRO AZIENDALE (siti di prima produzione):				
	<i>Coffea</i> (caffè)	<i>Lavandula dentata</i> (lavanda dentata, spigonardo)	<i>Nerium oleander</i> (oleandro)	<i>Olea europea</i> (olivo)	<i>Polygala myrtifolia</i> (polygala)	<i>Prunus dulcis</i> (mandorlo)
n° piante in prima* produzione						

* soggette a campionamento e analisi prima del primo spostamento

ISPM 31 – Table of sample size for 80% confidence levels at varying levels of detection according to lot size, hypergeometric distribution

Number of units in lot	P=80% (confidence level)				
	% level of detection x efficacy of detection				
	5	2	1	0.5	0.1
100	27	56	80	-	-
200	30	66	111	160	-
300	30	70	125	240	-
400	31	73	133	221	-
500	31	74	138	277	-
600	31	75	141	249	-
700	31	76	144	291	-
800	31	76	146	265	-
900	31	77	147	298	-
1000	31	77	148	275	800
2000	32	79	154	297	1106
.....	32	79	156	305	1246

Schema di campionamento

	<i>Olea europea</i>	<i>Prunus dulcis</i>	<i>Nerium oleander</i>	<i>Polygala mirtiflora</i>	<i>Coffea spp</i>	<i>Lavandula dentata</i>
N° di aliquote del campione pool	5	5	8	8	8	8

N.B. In caso di:

Piante sintomatiche

No pool ma prelievo singola pianta, nelle immediate vicinanze pool [P=80%, level 1% (ISPM 31)]

Analisi di laboratorio

Metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa* e delle sue sottospecie (allegato IV del Regolamento (UE) 2020/1201):

1. PCR in tempo reale sulla base di Harper *et al.*, 2010 (e erratum 2013);
 2. amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) sulla base di primer sviluppati da Harper *et al.* 2010 (e erratum 2013);
 3. PCR in tempo reale sulla base di Ouyang *et al.*, 2013;
 4. PCR convenzionale sulla base di Minsavage *et al.* 1994.
- **Analisi di I° livello:** Laboratorio Ufficiale del Servizio Fitosanitario
 - **Analisi di II° livello** (di conferma): Laboratori Nazionali di riferimento

Esito Negativo

- Autorizzazione uso Passaporto
- Commercializzazione del materiale oggetto di indagine

Esito Positivo

- Adozione misure fitosanitarie previste dalla normativa vigente

Monitoraggio 2022

Campionamento

Xylella fastidiosa

Legenda

- ◆ Sample taking - RUOP
- ◆ Sample taking - Territorio

Sito	Visual	Sample
Vivaio	-	3160
Territorio	-	350

Monitoraggio 2022

Trappolaggio

Xylella fastidiosa

Legenda

- ▲ Sweep net - RUOP
- ▬ Sticky traps - Territorio

Sito	Trapping
Vivaio	18
Territorio	16

Conclusioni

Il controllo di *Xylella fastidiosa* è complesso e deve essere adattato a ciascun caso, previo sviluppo di conoscenze approfondite sul patosistema e sulle interazioni specifiche del batterio in ciascun determinato ambiente (patogeno, vettori, ospiti, ambiente, pratiche colturali)

Obiettivo delle indagini: comprovare l'assenza dell'organismo nocivo qualora non sia stato ancora segnalato

alcun caso positivo o individuare il batterio nel caso in cui il parassita sia presente.

I risultati delle indagini effettuate dai Servizi Fitosanitari Regionali sul territorio di competenza, confermano l'assenza di *Xylella fastidiosa* in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle aree delimitate delle Regioni Puglia, Toscana e Lazio (DM 6 giugno 2019).

Maggiori informazioni sulla gestione dei focolai nazionali e dell'Unione possono essere reperite consultando le pagine web specifiche delle Regioni interessate e della Commissione UE:

- protezionedellepiante.it
- emergenzaxylella.it
- regione.toscana.it/speciali/speciale-xylella/
- https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa_en

Una sola misura non veste su tutto!

Grazie per l'attenzione