

FICO PAGNOTTA

***Ficus carica* L.**

N° REPERTORIO: 134
inserita il 02.12.2021

FAMIGLIA: Moraceae

GENERE: *Ficus*

SPECIE: *F. carica*

NOME COMUNE:
Fico domestico "a Pagnotta"

RISCHIO DI EROSIONE:
Alto

AREA AUTOCTONA
DI DIFFUSIONE:
Area Parco Naturale
del Conero (AN)

LUOGO DI
CONSERVAZIONE:
Campo germoplasma
frutticolo AMAP - Carassai
(AP)

Campo collezione
UNIVPM - Agugliano (AN)



CENNI STORICI

L'area di origine dell'accessione è sconosciuta; viene riportato nelle cultivar C da Murri G. in "Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani" (2016). Nell'Atlante, il gruppo C non ha una scheda descrittiva per mancanza di dati. Viene qui descritta una accessione nell'area del Conero.

AREA DI DIFFUSIONE

L'accessione è certamente diffusa nell'area marchigiana; in particolare nel Parco del Conero è presente e ben conosciuta dai coltivatori locali.

DESCRIZIONE BIOLOGICA ED ESIGENZE PEDO-CLIMATICHE

L'accessione ha una fruttificazione biferà con fioroni che maturano tra la terza decade di giugno e la prima decade di luglio. I forniti sono maturi nella terza decade di agosto.

Le produzioni sia degli uni che degli altri sono normalmente copiose e sono mediamente resistenti alle manipolazioni. Gli esemplari, di buona vigoria, non mostrano particolari esigenze in termini di esposizione e caratteristiche pedologiche. Tuttavia questo aspetto potrebbe essere approfondito in programmi di coltivazione e conservazione delle accessioni recuperate.

DESCRIZIONE BIO-MORFOLOGICA

ALBERO

Di elevata vigoria, portamento semieretto con chioma compatta; rami di un anno dal portamento ricurvo.

FOGLIA ADULTA

Palmato partita profondamente incisa, prevalente la forma pentalobata, con lobo centrale pentagonale, mar-

gine ad ondulature ampie; asse maggiore della foglia di circa 22 cm, asse minore circa 19 cm, colore pagina superiore verde intenso, colore pagina inferiore verde chiaro.

INFRUTTESCENZA (SICONIO-FIORONI)

Globosa, colore di fondo verde scuro con sovraccolori dominante porpora con lenticelle sparse bianche; peso variabile da 90 a 100 grammi.

CARATTERI DELLA POLPA

Granato intenso con cavità allungata all'interno, sapore intenso, con liquido lievemente acidulo.

FENOLOGIA

Varietà biferà con maturazione dei siconi tra la terza settimana di giugno e la prima di luglio; maturazione forniti tra la terza settimana di agosto e la prima settimana di settembre.

PRODUTTIVITÀ

Elevatissima

SUSCETTIBILITÀ O RESISTENZA A FITOPATIE

Bassa

COMPORTAMENTO AGRONOMICO E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ED ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO

I siconi presentano una buona pastosità e consistenza della polpa dolce, delicata ed un po' mielosa. L'epidermide è mediamente resistente alle manipolazioni e presenta spaccature a maturità che si dipartono dall'ostiole.

Il prodotto si presta principalmente al consumo fresco; i fioroni sono di buona pezzatura ed apprezzati dai coltivatori.

UTILIZZI GASTRONOMICI

La sua valorizzazione locale può fare riferimento al consumo negli agriturismi e nelle dimore rurali attive in ambito turistico ma anche al mercato ortofrutticolo di qualità, sia con i fioroni che con i forniti che possono trovare un ulteriore utilizzo nelle confetture.

BIBLIOGRAFIA

Fidighelli C. (a cura di) - Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani, 2016.



Custodi Biodiversità Agraria:

Marina Bottegoni, Varano (AN)

Pierino Stecconi, Varano (AN)

Dino Bucciarelli, Varano (AN)

Nella Picciafuoco, Varano (AN)

Tagliarini Rodolfo - Poggio (AN)

Ogni azienda indicata presenta pochi esemplari per autoconsumo e/o vendita diretta.

Scheda elaborata da:

Francesco Minonne - Parco Naturale Regionale "Costa Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase"

Enrico Maria Lodolini - CREA Centro di Ricerca Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura, sede Roma

Davide Neri, Giorgio Murri - Università Politecnica delle Marche D3A e Azienda Agraria

Isabella Dalla Ragione - Fondazione Archeologia arborea

Elisabetta Ferroni - Ente Parco Regionale del Conero

Ambra Micheletti - AMAP

