

ACERO CAMPESTRE - Acer campestre (Fam. Aceraceae)

DESCRIZIONE:

Albero deciduo di piccole o medie dimensioni, 10-20-(22) m, con tronco spesso sinuoso e chioma abbastanza densa che diviene rotondeggiante; di crescita non molto sostenuta in gioventù, diventa presto lenta, è poco longevo da 120-150 anni al massimo. **Le foglie** sono opposte, normalmente piccole di 4-7 cm, nei polloni possono arrivare a 12 cm, normalmente hanno 5 lobi ottusi a volte solo 3 lobi, il lobo mediano e anche i laterali, possono essere a loro volta essere leggermente lobati. **I fiori** sono riuniti in corimbi terminali molto spesso poligami e compaiono contemporaneamente alle foglie in aprile-maggio. **I frutti** sono delle disamare alate e maturano in settembre-ottobre, sono opposte con apertura di circa 180 gradi e i carpelli sono schiacciati con un bitorzolo al centro e con cuticola spessa. Hanno una lunga dormienza (ortodossi) e per la germinazione necessitano di un periodo di chilling (vernalizzazione) di 3-6 mesi per poter germinare.



PROVENIENZA:

FVM Scheda 277

Montelago - Camerino (MC)

Da Camerino si prende la strada che dalla frazione di S.Erasmo sale verso Montelago. Giunti sull'altopiano l'esemplare si trova a circa m.300 a sinistra dopo la strada che sale a sinistra verso Monte Campalto.

HABITAT:

Il suo areale,(Subpontico) comprende la maggior parte dell'Europa centrale e meridionale, ad est raggiunge la Vistola e il Don, al nord la Scozia e l'Irlanda. In Italia è presente in tutte le regioni.

CURIOSITA':

Età: 155 anni

Altezza: 6,5 metri

Altitudine s.l.m. 900 metri

